

2ª EDICIÓN



# Setas de Ávila

Guía Básica de Campo



Rafael Aramendi  
Horacio González



***Clavariadelphus truncatus*** (Quélet) Donk

#### Descripción:

**Carpóforo:** Con forma de maza truncada y algo deprimida, de color amarillo anaranjado, con la superficie estriada. La carne es blanca, de consistencia blanda y esponjosa, con sabor bastante dulce y sin olor característico.

#### Características ecológicas:

No es frecuente. Solo la observamos en algunos bosques mixtos de melojo y pino silvestre en el piso supramediterráneo durante el otoño, formando hileras o corros con numerosos ejemplares.

#### Observaciones:

Desconocemos su comestibilidad; contiene sustancias parecidas al sorbitol que le aportan el sabor azucarado. Podemos confundirnos con *Clavariadelphus pistillaris* que es mas pequeño, cilíndrico y sin la forma característica de maza truncada. Debido a su escasez no debemos recolectarla.





***Amanita citrina*** (Schaeffer) Roques

#### Descripción:

**Sombrero:** De globoso a plano-convexo, con el margen entero y regular, pudiendo alcanzar los 12 cm. de  $\varnothing$ . Cutícula lisa, separable del sombrero, de color amarillo claro, con placas irregulares y harinosas, de color blanquecino, procedentes del velo general.

**Himenóforo:** De láminas libres, apretadas, blancas con reflejos amarillos. Esporada blanca.

**Pie:** Cilíndrico, algo corto, bulboso, de color blanquecino amarillento, con anillo súpero, colgante, membranoso, con el borde granuloso y estriado. Presenta volva circuncisa de color blanco sucio.

**Carne:** Blanquecina amarillenta con olor muy definido a patata cruda o rabanito y con sabor algo dulce.

#### Características ecológicas:

Especie micorrizógena de diversos árboles. En nuestra provincia es frecuente y la observamos bajo encinas, alcornoques, castaños y robles.

#### Observaciones:

No tiene interés como comestible. Se puede confundir fácilmente con otras especies muy tóxicas.





***Boletus aestivalis*** (Poulet) Fr. Sin: *Boletus reticulatus*  
(Boleto Reticulado, Hongo de Castaño, "Champignon" en el Arenal)

#### Descripción:

**Sombrero:** De hemisférico a plano-convexo, con el margen excedente. Puede alcanzar los 25 cm. de Ø. Cutícula seca, ligeramente aterciopelada, de color marrón claro que se agrieta en tiempo seco.

**Himenóforo:** De tubos libres, blancos, con el tiempo amarillentos-verdosos, que se separan fácilmente del sombrero. Poros pequeños, redondeados, concoloros a los tubos e inmutables a la presión. Esporada de color marrón-oliva.

**Pie:** Obeso-cilíndrico, lleno, concoloro al sombrero y recubierto de un retículo blanquecino en relieve.

**Carne:** Blanca, inmutable al contacto con el aire. Con sabor dulce y olor afrutado.

#### Características ecológicas:

Especie micorrizógena de frondosas, con preferencia por castaños y robles y menos frecuente en encinas.

#### Observaciones:

Excelente comestible, aunque frecuentemente atacado por larvas. Muy apropiado para su conservación por secado. Algunos ejemplares que crecen bajo castaños no suelen presentar el retículo tan marcado y típico de la especie.



Ayuntamiento  
Cuevas del Valle



mediotec



Diputación  
de Avila